

日本脳炎予防接種に関する説明書

※接種方法については市町村担当課までご相談ください。

1. 日本脳炎ワクチン接種について

現在使用されているのは乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（いわゆる新ワクチン）です。このワクチンは平成 21 年 6 月より第 1 期対象者（生後 6 カ月～7 歳 6 カ月未満）に使用可能なワクチンとなりましたが、平成 22 年 8 月からは、第 2 期対象者（9～13 歳未満）にも使用可能となりました。

平成 7 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれで、第 1 期と第 2 期を合わせて 4 回の接種が完了していない方（以下、特例対象者：附則第 3 条）については、その不足分を 20 歳になる日の前日までを期間として、定期接種として受けることができるようになりました。接種スケジュールについては、別紙 2「日本脳炎特例対象者について（第 3 条）」をご参照ください。

<対象者>

分類	接種対象（標準的接種）	接種期限	
定期	1 期	生後 6 カ月～7 歳 6 カ月未満（3 歳、4 歳）	7 歳 6 カ月未満
	2 期	9 歳～13 歳未満（9 歳）	13 歳未満
特例	第 3 条	平成 7 年 4 月 2 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれ	20 歳の前日

<定期予防接種スケジュール>

●積極的勧奨者

- 第 1 期（3 回）…生後 6 カ月以上 7 歳 6 カ月未満（標準的接種は 3 歳より）
初回接種（2 回）：6 日以上、標準的には 28 日までの間隔にて 2 回接種
追加接種（1 回）：初回接種後 6 カ月以上、標準的にはおおむね 1 年の間隔をおいて 1 回接種（標準として 4 歳）
- 第 2 期（1 回）…9 歳以上 13 歳未満で 1 回接種（標準として 9 歳）

○積極的勧奨年齢

- 第 2 期接種の積極的勧奨（特例対象者：附則第 3 条）
18 歳：令和 7 年 4 月 1 日以降は、積極的勧奨の対象者はいません。
なお、予防接種は 20 歳の前日まで接種できます。

2. 病気の説明

日本脳炎ウイルスの感染によっておこる中枢神経（脳や脊髄等）の疾患です。ウイルスはブタ等の動物の体内で増え、その動物を刺した蚊（コガタアカイエカ等）がヒトを刺すことで感染します。（東アジア・南アジアに広く分布する病気です）

感染しても症状が現れずに経過する 경우가ほとんどですが、症状がでる場合には、6～16 日間の潜伏期間の後、数日間の高熱、頭痛、嘔吐等で発病し、引き続き急激に光への過敏症や意識障害・けいれん等の脳の障害がおこります。

脳炎を発症した場合は 20～40%の人が亡くなってしまいう病気とされています。

3. 日本脳炎ワクチンの副反応について

主なものは、発熱、せき、鼻水、注射部位の紅斑や腫れ、発疹などで、これらの副反応のほとんどは接種3日後までにみられています。なお、ごくまれにショック、アナフィラキシー様症状、急性散在性脳脊髄炎（ADEM）、脳症、けいれん、急性血小板減少性紫斑病などの重大な副反応がみられることがあります。

4. 健康被害救済制度

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものかの因果関係を専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

5. 予防接種を受ける前の一般的注意事項

予防接種は体調の良いときに受けるのが原則です。日頃の体質、体調など健康状態を知っておくようにしましょう。

- ① 予防接種の効果や副反応、健康被害救済制度について説明書をお読みいただき、理解した上で接種をお受けください。**わからないことがある場合は接種を受ける前に質問しましょう。**
- ② 他のワクチンを接種した場合、その後の接種間隔を各予防接種説明書で確認してください。
- ③ 当日はお子さんの健康状態をよく観察し普段とかわりないことを確認しておいてください。体調が悪いと思ったら、かかりつけ医に相談の上、接種するかどうか判断するようにしましょう。
- ④ 予診票は接種をする医師への大切な情報ですので、責任を持って記入してください。
- ⑤ 母子健康手帳を必ずお持ちください。

6. 予防接種を受けた後の一般的注意事項

- ① 接種後 30 分は急な副反応がみられることもありますので、接種会場でお子さんの様子を観察してください。
- ② 微熱、接種局所の発赤・腫れ・しこり、軽度の発疹など認められることがありますが、通常免疫反応であり、数日以内に自然に治るので心配の必要はありません。接種局所のひどいはれ・高熱・ひきつけなどの強い副反応の症状がありましたら、医師の診察を受けてください。また、診察の結果につきましては下記の市町村担当課までご連絡ください。
- ③ 接種当日は、はげしい運動は避けましょう。
- ④ 入浴は差し支えありませんが、注射した部分をこすらないようにしてください。

令和7年度版
茂原市長生郡医師会
長柄町福祉課